

Clcr = creatinineklaring

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Olbetam 28-7-2014	bij Clcr 30-60 ml/min: dosering verlagen tot 250 mg 1-2x per dag. bij Clcr < 30 ml/min: gecontraïndiceerd.

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- Volgens de registratiehouder van Olbetam (Pfizer) is het advies in het SPC aangepast naar aanleiding van uitgevoerde studies en veranderde inzichten. Verder geen details ontvangen.

Clcr < 10 ml/min:

- Bonadonna A ea. A pilot study of the pharmacokinetics and triglyceride lowering activity of acipimox in dialyzed uremic patients. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1985;23:112-4. Acipimox wordt niet significant uitgescheiden buiten de dialyse, maar tijdens dialyse wordt het efficiënt geklaard met t_{1/2} van 2.6 uur bij 6 personen na een 1-malige orale dosis van 50 mg. In een studie met 14 dialysepatiënten worden goede resultaten bereikt met 50-100 mg na elke dialysesessie gedurende 4 weken.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Ja	50 ml/min	6 januari 2015