

Clcr = creatinineklaring

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
SPC Baraclude 26-10-2018.	0	De klaring van entecavir neemt af en de AUC _{0-T} toe bij een verminderde nierfunctie. Waarden na 1-malig 1 mg oraal bij Clcr >80 ml/min (n=6), Clcr 50-80 ml/min (n=6), Clcr 30-50 ml/min (n=6), Clcr 20-30 ml/min (n=6): Cl _{t/f} (ml/min): 588.1, 309.2, 226.3 en 100.6. AUC _{0-t} (ng.h/ml): 27.9, 51.5, 69.5, 145.7. AUC bij 6 hemodialysepatiënten 233.9 ng.h/ml AUC bij 6 CAPD patiënten 221.8 ng.h/ml	- Clcr 30-49 ml/min: leverdecompensatie of lamivudine-refractair: 0,5 mg per dag. nucleoside-naïeve patiënten: 0,5 mg elke 48 uur of 0,25 mg per dag* - Clcr 10-29 ml/min: leverdecompensatie of lamivudine-refractair: 0,5 mg elke 48 uur of 0.3 mg per dag* nucleoside-naïeve patiënten: 0,5 mg elke 72 uur of 0,15 mg per dag* - Clcr < 10 ml/min, hemodialyse of CAPD: leverdecompensatie of lamivudine-refractair: 0,5 mg elke 72 uur of 0,1 mg per dag* nucleoside-naïeve patiënten: 0,5 mg elke 5-7 dagen of 0,05 mg per dag* * voor doses van minder dan 0,5 mg wordt de drank aanbevolen. NB: Baraclude is in Nederland alleen beschikbaar als tablet.

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Ja	50 ml/min	24 juni 2019