

Nierfunctie: azacitidine

2622

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			
Risicogroep			

Opmerkingen:

SPC Vidaza: er is geen formeel onderzoek uitgevoerd bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Bij nierfunctiestoornis wordt geen aanpassing van de aanvangsdosering aanbevolen. Bij onverklaarde dalingen van de waterstofcarbonaatconcentratie tot kleiner dan 20 mmol/l dient de dosering bij de volgende cyclus te worden verlaagd met 50%. Bij onverklaarde stijgingen in creatinine- of ureumstikstofconcentratie tot gelijk aan of hoger dan tweemaal de uitgangswaarden en boven de bovengrens van de normaalwaarde, dient de volgende cyclus te worden uitgesteld tot deze zijn teruggekeerd naar de normaalwaarde of naar de uitgangswaarde en dient de dosering bij de volgende cyclus te worden verlaagd met 50%.

→ Projectgroep: azacitidine is tot nu toe vooral in studie-verband gebruikt, daarbuiten is nog weinig ervaring mee. Er is nog geen duidelijke grens afgesproken, wordt nog verder uitgewerkt.

→ Projectgroep: azacitidine wordt voor 50-85% uitgescheiden met de urine. Het is aannemelijk dat een verminderde nierfunctie de klaring van azacitidine beïnvloedt.

Clcr < 10 ml/min:

—

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Ja	80 ml/min	23 februari 2010