

Clcr = creatinineklaring

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
SPC Zofil 24-3-2004.	0	Uit vergelijking van essentiële farmacokinetische parameters van zofenopriilaat, bepaald na orale toediening van radioactief gelabeld zofenopril calcium, blijkt dat patiënten met een licht verminderde nierfunctie (Clcr tussen 45 en 90 ml/min) zofenopril even snel uitscheiden als gezonde personen (Clcr meer dan 90 ml/min). Bij patiënten met een matig tot ernstig verminderde nierfunctie (Clcr 7-44 ml/min), is de eliminatiesnelheid ongeveer 50% van de normale snelheid.	Patiënten met een matig tot ernstig verminderde nierfunctie Moeten de helft van de gebruikelijke aanvangsdosering krijgen. De aanbevolen doseringen gelden ook voor de onderhoudsdosering. De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij patiënten met een myocardinfarct en een verminderde nierfunctie en bij infarctpatiënten die gedialyseerd worden. Derhalve is zofenopril bij deze patiënten gecontra-indiceerd. Bij patiënten met een nierziekte in het eindstadium, die met hemodialyse en peritoneaaldialyse worden behandeld, is de eliminatiesnelheid verminderd tot 25% van de normale snelheid. Dit geeft aan dat deze patiënten een kwart van de gebruikelijke aanvangsdosering moeten krijgen.

Risicogroep	
-------------	--

</