

Nierfunctie: glycopyrronium oraal

4138

Clcr = creatinineklaring, GFR = glomerulaire filtratie snelheid

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
SPC Seebri 17-10-2012	0	Na inhalatie: toename AUC_{last} 1.4x bij $eGFR \geq 30$ ml/min/1.73 m ² en 2.2x bij $eGFR < 30$ ml/min 1.73 m ²	bij $eGFR < 30$ ml/min 1.73 m² en bij patiënten die dialyse ondergaan alleen gebruiken als verwachte voordelen opwegen tegen het mogelijke risico. Meest frequente anticholinerge bijwerking: droge mond (2,4%). Andere gemelde anticholinerge symptomen: urineretentie, gastro-intestinale effecten waaronder gastro-enteritis en dyspepsie.

Overig	Opmerkingen
ZiekenhuisApotheek en Laboratorium Venray Glycopyrronium drank productinformatie 15-8-2011	Bij nierfunctiestoornis kan dosisverlaging noodzakelijk zijn.

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

–

Clcr < 10 ml/min:

–

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Ja	30 ml/min	25 juni 2013