

# Nierfunctie: alizapride

2585

Clcr = creatinineklaring

| Bron        | Bewijs | Effect | Opmerkingen |
|-------------|--------|--------|-------------|
| -           |        |        |             |
| Risicogroep |        |        |             |

## Opmerkingen:

- SPC Alizapride 17 juni 2009: aanbevolen wordt om de dosering alizapride te verminderen bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie. Tel. fabrikant: geen verdere informatie beschikbaar over dosis aanpassing bij een verminderde nierfunctie. De reden voor de aanbeveling om de dosering van alizapride aan te passen bij patiënten met een verminderde nierfunctie is enkel uit voorzichtigheid, omdat er geen gegevens over beschikbaar zijn.
- Projectgroep: ong. 80% wordt onveranderd met de urine uitgescheiden. Bij gestoorde nierfunctie moet rekening worden gehouden met een toename van de AUC. Een Clcr-grenswaarde van 50 ml/min is verdedigbaar.

Clcr < 10 ml/min:

-

|                         | Wijziging kinetiek | Actie | Clcr grens | Datum            |
|-------------------------|--------------------|-------|------------|------------------|
| Beslissing projectgroep | Onbekend           | Ja    | 50 ml/min  | 23 februari 2010 |