

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Hansten PD. DICP 1980;14:46.	propranolol + insuline	hypertensie en bradycardie tijdens hypoglykemie	1B
Deacon SP. Br Med J 1977;2:1255-7.	propranolol + insuline	voorkomt tachycardie (bradycardie) maar niet de andere symptomen van een hypo, en vertraagt herstel na insuline-geïnduceerde hypoglykemie bij 12 patiënten die glibenclamide gebruiken	3D
Sharma SD. Curr Ther Res 1979;26:252.	propranolol + insuline	versterkt initiële hypoglykemische werking van insuline; verlengde duur van zweten; geen vertraging van herstel na insuline-geïnduceerde hypoglykemie; tachycardie blijft afwezig	3D
Reeves RL. Clin Pharmacol Ther 1982;31:262-3.	propranolol + insuline	propranolol vernietigt de door isoprenaline-geïnduceerde afgifte van insuline bij 10 vrijwilligers, metoprolol had gering effect hierop	3B
Ryan JR. Drugs 1983;25 (suppl) 256-7.	propranolol + insuline	toename tensie bij hypoglykemie (38,8/14,3 mmHg)	3B
Ostman J. Acta Med Scand 1982;211:381-5.	alprenolol + insuline	toename tensie tijdens hypoglykemie (27/14 mmHg); metoprolol had geen effect	3B
McMurty RJ. Ann Intern Med 1974;80:669-70.	propranolol + insuline	toename tensie bij hypoglykemie tot 258/144 mmHg (projectgroep: fors effect, dus hoger scoren)	1E

Overig	Stof	Effect
Samii K. Lancet 1976;1:545-6.	propranolol + insuline	er zijn case-reports van hypoglykemie bij propranolol, pindolol, timolol met insuline. Hierbij lijken ook overige factoren in het spel te zijn (vasten, hemodialyse).

Opmerkingen

Risicofactoren	moeilijk instelbare diabetes
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Ja	Ja	24 september 2002