

Acenocoumarol/fenprocoumon + Tamoxifen

MFB 416

Protrombinetijd = PT

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Gustovic P. Therapie 1994;49:55-6.	acenocoumarol + tamoxifen	bewustzijnsverlies, massieve ventriculaire bloeding en PT 13%, 3 weken na start tamoxifen 20 mg/dag bij vrouw (53, hartklep) op acenocoumarol en amiodaron, PT was therapeutisch (33%). Patiënte overleed 2 dagen zonder bij bewustzijn te zijn geweest	1F

Overig	Stof	Effect
SPC Sintrom	acenocoumarol + tamoxifen	werking kan worden versterkt door tamoxifen

Opmerkingen

De Commissie Interacterende medicatie VKA's is verantwoordelijk voor de beoordeling van de te ondernemen actie.

Stockley (warfarine): established and clinically important interaction, which apparently affects some but not all patients.

SPC Marcoumar: tamoxifen niet genoemd.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	13 mei 2009

Ter informatie: Warfarine + tamoxifen

Protrombinetijd = PT

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Tenni P. BMJ 1989;298:93.	warfarine + tamoxifen	vrouw (43, dvt) oplaaddosis warfarine 25 mg, daarna 5 mg per dag, PT 19 sec. Na 7 weken start tamoxifen 40 mg/dag, na 1 dag PT 38 sec; dosisaanpassing warfarine nodig tot 1 mg/dag. Naar aanleiding hiervan retrospectieve analyse van vrouwen met borstkanker en vervolgens opname wegens ernstige trombo-embolie, dit bleken er 18 in 5 jaar. Bij 5 van 18 vrouwen werd warfarine toegevoegd aan tamoxifen. Bewijslast is gering, maar wel opvallend lage doseringen warfarine nodig en in 2 gevallen al ernstige bloedingen bij opstartdosis (subduraal hematoom; hematurie en PT 49 sec). Bij de overige 13 vrouwen geen opstartproblemen, onder-houdsdosering warfarine varieerde van 4 tot 10 mg.	1B 1-2 C-D
Ritchie LD. BMJ 1989;298:1253.	warfarine + tamoxifen	Retrospectief: analyse patiënten nav. Tenni 1989. In 8 jaar 22 patiënten op de combinatie, waarvan 17 geen problemen, 5 wel: - 2 x: sterk verhoogde british ratio's, geen bloeding; - 1 x: subconjunctivale bloeding zonder controleproblemen; - 1 x: bloeding in dij met controleproblemen; - 1 x: intraoculaire bloeding na start tamoxifen.	1-2C
Lodwick R. Br Med J (Clin Res Ed) 1987;295:1141.	warfarine + tamoxifen	vrouw (65, hartklep) 11 jaar op warfarine (27-28.5 mg/ week), PT 23-34 sec. Toename PT naar 39 sec (controlewaarde = 14 sec) 3 dagen na start tamoxifen 10 mg 2dd. 3 weken later PT 75.6 sec (controle 14 sec) tijdens een 5-daagse <i>cotrimoxazolkuur</i> ; warfarine niet aangepast. 6 weken later opname met hematemeses, buikpijn en hematurie, PT 206 sec (controle = 14 sec). Warfarine gestaakt, fresh frozen plasma gegeven, waarna afname PT tot therapeutische waarde en herstel klachten. 5 dagen later herstart warfarine met therapeutische PT bij warfarine 17.5 mg/week NB. de auteurs halen een ongepubliceerde casus aan van fabrikant, details ontbreken: toename PT van 20-22 naar 50-60 sec 1 maand na start tamoxifen.	2C-D

Toremifeen

Stockley: there appear to be no published reports of any interactions. Prod. info, in UK ontraden, in USA controle nodig.

PubMed: levert niets op.

→ GIC: toremifeen is niet idh in Nederland, nooit geweest ook. Is wel geregistreerd als Fareston.