

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Baldwin CM. DICP 1990;24:946-7.	lithium + lisinopril	lithiumintoxicatie (tremor, verward), toename Li-spiegel van 0,9 naar 3,8 mmol/l 3 weken na start lisinopril	1D
Douste-Blazy P. Lancet 1986 Jun 21;1:1448.	lithium + enalapril	lithiumintoxicatie (tremor, verward), toename Li-spiegel van 0.9 naar 3.3 mmol/l, 5 weken na start enalapril	1D
Correa FJ. Am J Med 1992;93:108-9.	lithium + lisinopril lithium + enalapril	casus 1: lithiumintoxicatie, toename Li-spiegel naar 3,7 mmol/l 24 dagen na start lisinopril; casus 2: lithiumintoxicatie, toename Li-spiegel van 0,7 naar 1,8 mmol/l 26 dagen na start enalapril	1D 1D
Pulik M. Presse Med 1988;17:755.	lithium + captopril	lithiumintoxicatie, toename Li-spiegel tot 2,35 mmol/l binnen 10 dagen na start captopril	1D
Mahieu M. Presse Med 1988;17:281. + Drouet A. Encephale 1990;16:51-2.	lithium + enalapril	lithium-intoxicatie	1D
Vipond AJ. Anaesthesia 1996;51:1156-8.	lithium + perindopril	lithiumintoxicatie, toename Li-spiegel tot 4,28 mmol/l, 3 maanden na start perindopril+bendrofluazide	3D
Finley PR. J Clin Psychopharmacol 1996;16:68-71.	lithium + enalapril (6x) lisinopril (3x) captopril (1x)	toename Li-spiegel met gemiddeld 35% + symptomen bij 20% van de patienten	1D
Leung M. J Clin Psychopharmacol 2000;20:392-3.	lithium + valsartan	lithiumintoxicatie, toename Li-spiegel van 0,9 naar 1,4 mmol/l 2 weken na start valsartan	1D
Blanche P. Eur J Clin Pharmacol 1997;52:501.	lithium + losartan	lithiumintoxicatie (oa verward, ataxie), toename Li-spiegel van 0,63 naar 2 mmol/l 5 weken na start losartan	1D

Overig	Stof	Effect
DasGupta K. J Clin Psychiatry 1992;53:398-400.	lithium + enalapril	geen effect enalapril op Li-spiegel bij jonge vrijwilligers. Beschreven tijdsduur tot de effecten: van 10 dagen tot 3 maanden.

Opmerkingen

Werkgroep Interacties en MFB's 21-6-21: bij advies toevoegen: overleg met voorschrijver of vervangen RAAS-remmer mogelijk is.

WFG 25-03-2008: aliskiren toevoegen, beschouwen als RAAS-remmer.

Idem 19-12-2006: als actie: adviseer voorschrijver extra controle van lithiumspiegel (2x per week in beginperiode) na start of dosisverhoging RAAS-remmer en bij staken. Bij risicopatiënten: overweeg verlaging lithiumdosis met 1/3 tot 1/2. Informeer patiënt over verschijnselen Li-intoxicatie; folder I-23.

- specificeren extra controle op basis van TDM-advies NVZA: adviseer de lithiumspiegel twee keer per week te (laten) controleren totdat opnieuw een stabiele situatie verkregen is.

- symptomen analoog aan Lithiumrichtlijn NVvP (Nederlandse vereniging voor psychiatrie): braken, diarree, dronkemanspraak en -gang, spierschokken en spierzwakte, slaperigheid en sufheid.

De leidraad 'de bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen' van de lithiumpluswerkgroep + VMDB stelt dat zowel de patiënt als naastbetrokkenen op de hoogte moeten zijn van de symptomen van lithiumintoxicatie.

Risicofactoren	ouderen; hartfalen; verminderde nierfunctie; wijziging water/Na-inname
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Ja	Ja	21 juni 2021