

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Neuvonen PJ. Br Med J 1970;4:532-4	ferrosulfaat + tetracycline oxytetracycline doxycycline	gezonde vrijwilligers: afname spiegel tetracycline met 40-50% afname spiegel oxytetracycline met 50-60% afname spiegel doxycycline met 80-90%	3C
Neuvonen PJ. Eur J Clin Pharmacol 1974;7:361-3.	ferrosulfaat + doxycycline oraal doxycycline i.v.	7 patienten: afname spiegel oraal doxycycline met 20-45% afname t $\frac{1}{2}$ van 16.6 naar 11.0 uur (iv)	3C
Gothoni G. Acta Med Scand 1972;191:409-11.	ferrosulfaat + tetracycline	ijzer $\frac{1}{2}$ -2 uur voor tetracycline: afname spiegel tetracycline ijzer 3 uur voor tetracycline: geen invloed ijzer 1 uur na tetracycline: afname spiegel tetracycline met 40% ijzer 2-3 uur na tetracycline: geen invloed	3C
Leyden JJ. J Am Acad Dermatol 1985;12:308-12.	ferrosulfaat + minocycline tetracycline	afname absorptie minocycline 77% afname absorptie tetracycline 81%	3C

Opmerkingen

Werkgroep Interacties 2-12-19: als standaardadvies bij 'interval-interacties' zo veel mogelijk toepassen: X ten minste 2 uur VOOR of 4 uur NA Y. GIC: interval wijzigt dus niet, was hier al zo.

Stockley: well documented and well-established interaction of clinical importance.

GIC 2-6-2014: conform interactie Tetracyclines + antacida interval '2 uur voor of 4 uur na'.

Projectgroep 2002: of ijzer tijdelijk staken (bij doxy), of doxycycline vervangen door ander tetracycline of antibioticum; bij doxycycline nooit interval (want enterohepatische kringloop). Heeft geen gevolgen voor folder. Als een ander tetracycline wordt afgeleverd: vertel patiënt tetracycline ten minste 2 uur VOOR ijzer, geef interactiefolder I-20 en medicatieschema mee.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing Werkgroep IA	ja	ja	2 december 2019