

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Gerhardt RE. Ann Intern Med 1969;71:927-33.	kinidine + acetazolamide of NaHCO ₃	- 4 vrijwilligers: afname renale excretie van 103 naar 31 µg/min (pH<6 resp. pH>7,5), afname klaring van 53 naar 26 ml/min (pH 6-7 resp. 7-8); - 6 vrijwilligers (pH>7): 2x toename QT-interval en spiegel, 3x toename spiegel en wijziging QT-interval niet meetbaar; 1x geen effect spiegel	A E

Overig	Stof	Effect
SPC Diamox	acetazolamide	kan urine alkalisch maken. Hierdoor kan kinidine vertraagd worden uitgescheiden.
SPC Kinidine Teva	kinidine	geen melding interactie.

Opmerkingen

Stockley: 'an established interaction, but with the exception of the one isolated case cited (Zinn MB. Quinidine intoxication from alkali ingestion. Tex Med 1970;66(12):64-6), there seem to be no reports of problems'. Toch wordt controle van de effecten bij starten/staken aanbevolen. Vermijd combinatie of verlaag zo nodig de kinidinedosis.

PubMed: -

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	14 januari 2003