

Calcipotriol + Salicylzuur

Bron	Pagina	ref.nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten	-				
Stockley	-				
Extra					

Opmerkingen:

Onverenigbaarheid:

- GeBuP 1994;28:95: Salicylzuur inactieveert calcipotriol. Salicylzuur niet geabsorbeerd, blijft enkele uren op huid achter. Calcipotriol kan onwerkzaam gemaakt worden indien binnen enkele uren na salicylzuur opgebracht.
- Tel. contact + brief van Leo Pharmaceutical 8-10-1996: de informatie uit GeBuP wordt opgenomen in deel IB Daivonex.
- Brief Leo Pharmaceutical Products 22-09-97: Calcipotriol is instabiel bij lage pH. Na applicatie van salicylzuur op de huid verandert de pH van de huid nauwelijks. Na enige minuten tot één uur is salicylzuur zelfs grotendeels verdwenen. Veiligheidshalve wordt interval van één uur aanbevolen.

Huidige informatie:

- SPC Daivonex januari 2002: Vanwege een mogelijk effect op het calciummetabolisme is het niet geoorloofd penetratiebevorderende stoffen (bv acidum salicylicum) aan de crème toe te voegen. Dus geen melding over onverenigbaarheid. De info uit 1996 over de onverenigbaarheid is zelfs in tegenspraak met het IB.
- SPC diverse salicylzuurpreparaten: geen melding.

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Nee	Nee	4 februari 2003

