

# Methyldopa + IJzer

**MFB 490**

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Campbell N. Clin Pharmacol Ther 1988;43:381-6.	methyldopa + ferrosulfaat ferrogluconaat	vrijwilligers: afname absorptie methyldopa van 29 naar 8%; toename bloeddruk bij 3 van 5 hypertensieve patiënten (>15 mmHg syst., >10 mmHG diast.)	3D

Overig	Stof	Effect
Campbell NR. Br J Clin Pharmacol 1991;31:251-5.	methyldopa + ferrosulfaat	Review - verwijzing naar ongepubliceerde data: afname absorptie methyldopa na inname ferrosulfaat 1 resp. 2 uur voor methyldopa: 55 resp. 42%
Roelofsen EPW ea. PW 1997;132:1946-7.	methyldopa + ijzer	casus waarin eigenlijk niets gebeurt.

## Opmerkingen

Projectgroep 2002: ernst D, want methyldopa wordt meestal bij zwangeren toegepast (zw.hypertensie). Bij advies: "overleg over vervanging methyldopa" is geen optie, want het gaat meestal om zwangeren. "Regelmatig bloeddrukcontrole" is een open deur. Methyldopa ten minste 2 uur VOOR ijzer. Geef medicatieschema mee. WFG 9-10-2000: in principe interval 2 uur aangehouden; elk tijdstip is in feite niet onderbouwd.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	ja	ja	23 april 2002