

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Campbell NRC. Ann Intern Med 1992;117:1010-3.	levothyroxine + ferrosulfaat	studie met 14 patienten ingesteld op levothyroxine: toename TSH van 1,6 naar 5,4 mE/l door FeSO <sub>4</sub> ; bij 9 van 14 patienten verergerden de symptomen van hypothyreoidie	3C
Shakir KMM. South Med J 1997;90:637-9.	levothyroxine + ferrosulfaat	hypothyreoidie, toename TSH van 2,8 naar 56 E/ml 4 weken na start FeSO <sub>4</sub> ondanks gescheiden innemen; na verhogen dosis levothyroxine verbeterde dit. 6 weken na staken FeSO <sub>4</sub> was TSH <0,1 mE/l, en is dosis levothyroxine weer verlaagd. Bij herstart FeSO <sub>4</sub> trad weer hypothyreoidie op.	2C
Schlienger JL. Presse Med 1994;23:492. French.	levothyroxine + ferrosulfaat	hypothyreoidie na start FeSO <sub>4</sub> (geen details beschikbaar)	1C

Overig	Stof	Effect
SPC Eltroxin, Thyrax	levothyroxine + Fe-, Ca-, Mg	Ca-, Mg-, Al-, Fe-suppl, kunnen absorptie verminderen, inname interval.

### Opmerkingen

Projectgroep: thyreomimeticum ten minste 2 uur VOOR ijzer innemen.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	23 april 2002