

# Moclobemine/selegiline/rasagiline + amfetaminen

## 2402

Bron	Pagina	Ref.nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten	-			
Stockley ed. 5	607-8	moclobemide		zie opmerkingen
Extra				

### Opmerkingen

Moclobemide: geen literatuur te vinden.

Niet in deel IB Aurorix (moclobemide). Deel IB Ritalin (methylfenidaat): niet samen gebruiken met antidepressiva van het MAO-remmer type.

Stockley: p. 607-8 volgens fabrikant verstandig de combinatie te vermijden, niet te verwachten dat gevolgen interactie zo ernstig zijn als bij niet-selectieve MAO-remmers.

- J Clin Psychopharmacol 1996;16:468-9: patiënt met major depression en ADHD succesvol behandeld met combinatie moclobemide + methylfenidaat. Geen stijging bloeddruk.

Selegiline zat in IAKode 1236 (MAO-remmers + amfetaminen), daaruit verwijderd.

Niet in deel IB Eldepryl.

Oktober 2005: rasagiline toegevoegd. SPC Azilect: noemt dit niet.

Alfanum. code	--			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
Incidentie	

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	18 september 2001

<p>Raadpleeg</p> <p>Besluit van de projectgroep Interacties van WINAp Geneesmiddelinformatie op 18-9-2001: dit is GEEN interactie.</p> <p>In theorie kan de bloeddruk stijgen. Bij combinatie van moclobemide, rasagiline of selegiline met een amfetamine is de interactie niet gemeld. De interactie is wel gemeld bij combinatie van een niet-selectieve MAO-remmer met een amfetamine, zie interactie 1236.</p> <p>De Amerikaanse fabrikant van moclobemide adviseert de combinatie te vermijden. De Nederlandse fabrikanten van moclobemide, rasagiline en selegiline waarschuwen niet voor de interactie.</p> <p>Er is wel een melding van een patiënt met major depression en ADHD die succesvol werd behandeld met de combinatie moclobemide + methylfenidaat. Geen stijging van de bloeddruk.</p> <p>Literatuur:          - J Clin Psychopharmacol 1996;16:468-9.          - Registratiedossier (deel IB) Aurorix, Eldepryl.</p>	Monitoring	Staken	Voorschrijver	Balie	Apotheker	Periode
	0	-	0	0	0	-