

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Dingemans J. Int Clin Psychopharmacol 1993;7:167-80.	moclobemide + selegiline	vrijwilligers: combinatie vertoont veel hogere 'tyramine sensitivity factor'* dan de afzonderlijke stoffen: alleen moclobemide 2-3, alleen selegiline 1.4, combinatie moclobemide+selegiline 8-9. * ratio van de hoeveelheid intraveneus tyramine die nodig is voor een toename van de systolische bloeddruk met 30 mmHg bij baseline en bij gebruik geneesmiddel.	3A
Korn A. Eur J Clin Pharmacol 1996;49:273-8.	moclobemide + selegiline	vrijwilligers: combinatie vertoont veel hogere 'tyramine sensitivity factor' dan de afzonderlijke stoffen Vervolg op Dingemans 1993, zelfde onderzoeksgroep	3A

Overig	Stof	Effect
SPC Eldepryl	moclobemide + selegiline	tot op heden is geen interactie met moclobemide gemeld, maar is in theorie mogelijk. Daarom wordt combinatie ontraden.
SPC Xadago	safinamide + MAO-remmers	Xadago niet samen toedienen met andere MAO-remmers (zoals moclobemide), want er bestaat risico op niet-selectieve MAO-remming die kan leiden tot een hypertensieve crisis. Er moeten ten minste 7 dagen zitten tussen einde behandeling Xadago en begin behandeling MAO-remmers.

Opmerkingen

WFG 22-11-2016: safinamide koppelen, er is geen bewijs maar wel farmacologische onderbouwing dat safinamide de interactie ook geeft.

WFG 20-9-2005: rasagiline toevoegen. SPC Azilect (rasagiline): noemt dit niet.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	22 november 2016