

Raloxifeen + Colestyramine

M 538

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
prod.info (bron: Stockley ed. 8:1277-8/ref. 1, 3)		afname absorptie raloxifeen met 60%	0A

Overig	Stof	Effect
SPC Evista	raloxifeen	dient niet gelijktijdig te worden gebruikt met colestyramine (of andere anionwisselende harsen), dat de absorptie en enterohepatische kringloop van raloxifeen significant verlaagt. Tel. med. fabrikant Eli Lilly 2001: data on file, is voor eigen gebruik, gegevens studie mogen ook niet mondeling worden doorgegeven. Er is wel een farmacokinetische studie uitgevoerd, met als conclusie: colestyramine vermindert het effect van raloxifeen of maakt het onwerkzaam.
SPC Cholestagel	colesevelam	meldt de interactie niet.

Opmerkingen

WFG 29-1-08: colesevelam niet koppelen, want geen onderbouwing.

PubMed juni 2019: niets.

Projectgroep 2002: effect = A (verlaagde spiegel zonder gevolgen). Argumentatie voor actie Nee: nog te weinig/kort ervaring om gevolgen te weten van falen van raloxifeen (geen 1e keusmiddel); er zijn studies waaruit blijkt dat er een dosis-effect-relatie is.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	23 april 2002