

# MAO-remmers + levodopa enkelvoudig

M 580

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Hunter KR. BMJ 1970;3:388.	fenelzine	met 50 mg levodopa hypertensie 190/130mm Hg; rechallenge: met 25 mg geen stijging bloeddruk	2D
Teychenne PF. Clin Pharmacol Ther 1975;18:273-7. & Sharpe J. Can Med Assoc J 1972;107:296-300.	tranylcypromine	hypertensie	1C-D

Overig	Stof	Effect
Kott E. NEJM 1971;284:395.	nialamide*	verergering akinesie en tremor  * nialamide in Nederland niet in de handel.

## Opmerkingen

Er is geen recente literatuur.

Selegiline: doet hetzelfde, maar is uitgezonderd van deze interactie. Waarschijnlijk vanwege therapeutische combinatie (Hansten: "favorable effects with combination").

Over moclobemide is niets te vinden.

Alfanum. code	fenelzine: 2D	tranylcypromine: 1D		
---------------	---------------	---------------------	--	--

Risicogroep	-
Incidentie	-

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	15 januari 2002



Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers