

Clozapine + Risperidon

M 585

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Tyson SC. Am J Psychiatry 1995;152:1401-2.		toename clozapinespiegel van 344 naar 598 ng/ml 2 weken na start risperidon, antipsychotisch effect verbeterde, geen bijwerkingen.	1A
Koreen AR. Am J Psychiatry 1995;152:1690.		toename clozapinespiegel van 829* naar 1800 ng/ml door geleidelijk overzetten van clozapine naar risperidon; geen symptomen clozapine-overdosering * projectgroep: startspiegel 829 ng/ml is al te hoog (">350 ther.effect; >700 convulsies")	1A
Radford JM. J Clin Psychopharmacol 1995;15:225-6.		clozapine abrupt gestaakt ipv afgebouwd; volgende dag start risperidon en op dag 2 dystonie (mogelijk een cholinerg rebound effect)	1A

Overig	Stof	Effect
Chong SA. J Clin Psychopharmacol 1997;17:130-1.		projectgroep: telt niet mee want mogelijk additie van 2 andere middelen, bovendien hoge startdosis risperidon geeft al reflxtachycardie ("hartkloppingen, onregelmatige pols 3 dagen na start risperidon, clozapinespiegel vrijwel ongewijzigd; 3 dagen na staken risperidon weer sinusritme. 3 dagen na herstart risperidon trad weer ritmestoornis op. Vrouw gebruikte al propranolol en trihexyfenidyl").
Henderson DC. J Clin Psychiatry 1996;57:395-7.		in studie met 12 schizofrene patiënten bleek toevoeging van risperidon aan clozapine effectief en werd goed verdragen. De clozapinespiegel werd niet beïnvloed.
Morera AL. Acta Psychiatr Scand 1999;99:305-7.		er zijn meldingen van een positief effect met de combinatie.
SPC Leponex, Risperidal		gelijktijdig gebruik van anticholinergica/antipsychotica vergroot het risico op het ontstaan van tardieve dyskinesie.

Opmerkingen

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	23 april 2002