

Tacrolimus/sirolimus + statines

Bron	Pagina	ref.nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten	-			
Stockley	-			
Extra				

Opmerkingen:

Tacrolimus:

- discutabele casus (tevens felodipine gebruik): spierpijn (na 3 weken) en rhabdomyolyse bij niertransplantatiepatiënt, 5 weken* na dosisverhoging simvastatine van 10 naar 20 mg/dag; dalspiegel tacro van 6.4-13.9 naar 9.1 ng/ml (vreemd), serumcreat. van 0.9-1.4 naar 3 mg/dl; herstel na omzetten simva naar fluvastatine 40 mg/dag. *tevens fusidinezuur gestart, maar bij rechallenge met alleen fus.zuur 500 mg 3dd gebeurde er niets (Kotanko P ea. Nephron 2002;90:234-5).
- Bij omzetten van ciclosporine naar tacrolimus bij patiënten die tevens een statine gebruikten traden geen problemen op; is geen interactiestudie (Transpl proc 1998;30:2030-2).
- SPC Prograft noemt statines niet.
- IDIS, PubMed: niets

Sirolimus:

- SPC: combinatie met statine en/of fibraat lijkt goed getolereerd te worden; bij combinatie wel controleren op ontwikkeling rhabdomyolyse en andere bijwerkingen.
- PubMed, IDIS, Mmedex: niets

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	nee	nee	14 januari 2003

