

MAO-remmers* + Overige opioïden**

M625

* fenelzine, tranylcypromine, moclobemide, rasagiline, selegiline

** alle opioïden behalve fentanyl, oxycodon, pethidine, tramadol

| Onderbouwend | Stof | Effect | Code |
|--------------|------|--------|------|
| -- | | | |

Opmerkingen

Hansten: morphine does not appear to cause such severe reactions; thus although it cannot be used with impunity with nonselective MAOIs, it is preferable to meperidine.

SPC Aurorix: pethidine wordt ontraden, bij andere opiaten mogelijk opiaatdosis aanpassen.

SPC morfine, hydromorfon, alfentanil, pentazocine, sufentanil: contra-indicatie, 2 weken interval nodig met MAO-remmers.

SPC butorfanol, buprenorfine: geen contra-indicatie, alleen waarschuwing in "interacties".

SPC methadon: zegt niks.

Pethidine loopt via:

FENELZINE/TRANYLCYPROMINE + PETHIDINE, Ja/Ja (M 1042)

MOCLOBEMIDE/SELEGILINE/RASAGILINE + PETHIDINE, Ja/Ja (M 1045)

Fentanyl, oxycodon, tramadol lopen via:

FENELZINE/TRANYLCYPROMINE + FENTANYL, Ja/Ja (M 1043)

FENELZINE/TRANYLCYPROMINE + OXYCODON/TRAMADOL, Nee/Ja (M 1044)

MOCLO/SELE/RASAGILINE + TRAMADOL/OXYCODON/FENTANYL, Nee/Nee (M 1046)

| | |
|-------------|--|
| Risicogroep | |
|-------------|--|

| | Interactie | Actie | Datum |
|----------------|------------|-------|-----------------|
| Beslissing WFG | Nee | Nee | 15 januari 2002 |