

Theofylline + Nifedipine

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Robson RA. Br J Clin Pharmacol 1988;25:397-400.		afname theo-klaring met 9% bij 9 vrijwilligers bij gebruik van nifedipine 20 mg 2dd 4 dagen	3A

Overig	Stof	Effect
Parrillo SJ. Ann Emerg Med 1984;13:216-7.		misselijkheid, braken ong. 2 dagen na start nifedipine; theofyllinespiegel 30.5 mg/ml. Projectgroep: telt niet mee, kan iets anders aan de hand zijn dan interactie (moeilijk in te stellen patient).
Harrod CS. Ann Intern Med 1987;106:480		misselijkheid, tachycardie ong. 3 weken na start nife 10 mg 2dd; theo-spiegel 41 mcg/ml. Rechallenge: dito met theo-spiegel 23 mcg/ml. → Projectgroep 2003: niet onderbouwend, effect te langzaam (remming gaat sneller); rechallenge andere getallen (23 vs 41), mogelijk moeilijk in te stellen patient. Casus zijn niet in overeenstemming met studie.

Opmerkingen:

- Smith SR. J Clin Pharm Ther 1989;14:403-8: effect op theo-spiegel niet significant bij gebruik gedurende 7 dagen.
- Christopher MA. Chest 1989;95:309-13: geen klinisch relevant effect op theo-kinetiek bij niet-rokende astmapatienten bij gebruik gedurende 7 dagen.

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	4 februari 2003