

Ropinirol + Ciprofloxacin

MFB 643

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
SPC Requip		in een studie met ropinirol 2 mg 3dd bij Parkinson-patiënten verhoogde ciprofloxacin de Cmax en AUC van ropinirol met 60% resp. 84%. Fabrikant Glaxo Wellcome 18-8-2003: verwijst naar een overzichtsartikel (Kaye CM ea. Clinical pharmacokinetics of ropinirole. Clin Pharmacokinet 2000;39:243-52) waarin de studie uit het SPC wordt gerefereerd. Gaat om 12 patiënten, door wie ropinirol goed werd verdragen, zonder of met ciprofloxacin 500 mg 2dd. "There were no clinically important changes in patient's vital signs or electrocardiograms." De literatuurreferentie van deze studie is: data on file 1998, SmithKline Beecham → Kan GIC niet bestellen.	1A
Requip. GSK. US Prescribing information.		toename AUC ropinirol met 84% en Cmax met 60%; studie in 12 patiënten, ropinirol 2 mg 3dd, ciprofloxacin 500 mg 2dd	1A

Overig	Stof	Effect
SPC Requip		Zo nodig bij starten/stoppen ciprofloxacin ropiniroldosis aanpassen. Ropinirol wordt voornamelijk gemetaboliseerd door CYP1A2.

Opmerkingen

Stockley: the clinical relevance of the slight increase had not been assessed.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	16 december 2003