

Sertindol + Fluoxetine/Paroxetine

Bron	Pagina	ref.nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten	-				
Stockley ed. 6	735	Walker-Kinnear M. Br J Psychiatry 1997:170:389. – paroxetine		onttrekkingsverschijnselen paroxetine (slapeloosheid, zweten, agitatie, misselijkheid), bij combinatie met sertindol. Patiënt had bij eerder stoppen paroxetine (zonder gebruik sertindol) geen onttrekkingsverschijnselen gehad. Mogelijk mechanisme: paroxetine zorgt voor downregulatie 5-HT ₂ receptoren, sertindol blokkeert 5-HT ₂ receptoren. Bij staken paroxetine: tekort serotonine. Oordeel WFG: geen bewijs voor de interactie, onttrekking kan ook optreden zonder sertindol. Eén keer stoppen zonder bijverschijnselen, betekent niet dat je volgende keer ook geen bijverschijnselen krijgt.	
Extra	SPC Serdolect		0	plasmaconcentratie sertindol neemt toe met een factor 2 tot 3 bij combinatie met fluoxetine of paroxetine	A

Opmerkingen:

SPC Serdolect: sertindol met name gemetaboliseerd door CYP2D6 en CYP3A4; sertindol verlengt QT- interval. Dit is dosisafhankelijk. ECG monitoring nodig. Plasmaconcentratie sertindol neemt toe met een factor 2 tot 3, bij gelijktijdige behandeling fluoxetine of paroxetine. Combinatie sertindol met deze middelen en andere 2D6 remmers met buitengewone voorzichtigheid. ECG monitoring en eventueel dosisverlaging.

Risicogroep	Bestaand verlengd QT-interval
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	22 juni 2004

