

Vaccins levend + Pimecrolimus/Tacrolimus cutaan

Bron	Pagina	ref.nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten	-	-		
Stockley ed. 6	-	-		
Extra				

Opmerkingen:

SPC Elidel: gebaseerd op de minimale hoeveelheid pimecrolimus die geabsorbeerd wordt, is een mogelijke systemische interactie met vaccinatie onwaarschijnlijk. Deze interactie is echter niet onderzocht. Daarom is het bij patiënten met uitgebreide atopische dermatitis aanbevolen vaccinaties toe te dienen tijdens de behandelingsvrije intervallen.

SPC Protopic: systemische blootstelling na lokale toediening is laag, < 1.0 ng/ml. Mogelijke interactie met vaccins is niet onderzocht. Omwille van het eventuele risico op het mislukken van de vaccinatie, dient deze te geschieden vóór de aanvang van de behandeling of gedurende een behandelingsvrij interval met een periode van 14 dagen tussen de laatste toediening van Protopic en vaccinatie. Bij levend verzwakte vaccins moet deze periode uitgebreid worden tot 28 dagen of dient het gebruik van een alternatief vaccin overwogen te worden. Kinetiek: tacrolimusconcentraties in de systemische circulatie zijn na lokale toediening laag en (indien meetbaar) van voorbijgaande aard. Bij volwassenen en kinderen met behandeld lichaams-oppervlak van gem. 50%, is de systemische blootstelling ong. 30x lager dan na orale toediening. De laagste tacrolimus-bloedconcentratie waarbij systemische effecten kunnen worden waargenomen is niet bekend. Geen aanwijzing voor systemische cumulatie bij cutaan gebruik gedurende langere (tot 1 jaar) perioden.

Pubmed: Niets

Alfanum. code	--
---------------	----

Risicogroep	
Incidentie	

	Code	Interactie	Actie	WFG-Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	14 december 2004

Tekst						
Raadpleeg	<p>Besluit van de Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) van WINAp Geneesmiddelinformatie op 14-12-2004: dit is GEEN interactie</p> <p>Ondanks dat in het registratiedossier van pimecrolimus en tacrolimus de interactie wordt genoemd, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur. Gezien de minimale systemische absorptie van cutaan pimecrolimus of tacrolimus, is een interactie met levend verzwakte vaccins onwaarschijnlijk. De interactie is echter niet onderzocht. De fabrikanten van pimecrolimus en tacrolimus (cutaan) adviseren te vaccineren tijdens behandelingsvrije intervallen.</p> <p>Literatuur: - Registratiedossiers (SPC's) Elidel, Protopic.</p>					
	Monitoring	Staken	Voorschrijver	Balie	Apotheker	Periode
	0	0	0	0	0	-

Opmerkingen: