

Ezetimib + Colestyramine

M 679

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
SPC Ezetrol	ezetimib + colestyramine	afname gemiddelde AUC van ezetimib + actieve metaboliet met ongeveer 55% bij gelijktijdige inname met colestyramine. Neem ezetimib minstens 2 uur voor of 4 uur na de galzuurbindende hars in.	1A

Overig	Stof	Effect
SPC Ezetrol	ezetimib + colestyramine	ezetimib wordt in de darmwand omgezet tot het actieve glucuronide. Ezetimib en zijn glucuronide-conjugaat ondergaan een enterohepatische kringloop. Mechanisme: ezetimib wordt waarschijnlijk in de darm gebonden aan colestyramine. Hierdoor neemt zowel de absorptie af, als wordt de enterohepatische kringloop van ezetimib doorbroken.

Opmerkingen

GIC 2-6-20: advies aangepast naar 4 uur VOOR (was 4 uur VOOR of NA), is standaardadvies bij galzuurbindende harsen.

WFG 14-12-04: het is niet waarschijnlijk dat de middelen gecombineerd worden, ondanks zelfde indicatiegebied. De verwachting is dat ezetimib ipv de hars wordt toegepast.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	ja	14 december 2004