

Ezetimib + Ciclosporine

Bron	Pagina ref.nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten	-		
Stockley ed. 6	-		
Extra	SPC Ezetrol	2 1	<p>- 8 patiënten stabiel op ciclosporine en creatinine-klaring >50 ml/min: toename AUC 3.4x totaal ezetimib na 1x ezetimib in vergelijking met gezonde controle groep (n=17);</p> <p>- 1 niertransplantatiepatiënt (uit andere studie) met ernstige nierinsufficiëntie had 12x hogere blootstelling aan ezetimib dan controlegroep; patiënt had veel comedicaatie maar deze wordt niet gespecificeerd.</p> <p>voorzichtigheid bij instelling ezetimib naast ciclosporine. Rubriek overdosering: ezetimib wordt goed verdragen bij overdosering (40-50 mg per dag), geen (ernstige) bijwerkingen of toxiciteit gezien. Bovendien bleek bij vrijwilligers de AUC van ciclosporine iets verhoogd (met ong. 15%).</p>

Opmerkingen:

Mechanisme: onbekend.

Ezetimib wordt in de darmwand omgezet tot het actieve glucuronide. Ezetimib en zijn glucuronide-conjugaat ondergaan een enterohepatische kringloop.

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	14 december 2004

