

Triptanen (niet via MAO-A) + moclobemide / fenelzine / tranylcypromine

5118

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten datum	--			
Stockley ed. 8	--			
Extra				
Stockley ed. 8	604-5	7	frovatriptan + moclobemide	geen farmacokinetische verschillen bij toediening moclobemide 150 mg 2 dd gedurende 7 dagen met en zonder frovatriptan 2.5 mg éénmalig op dag 7. Studie onder 9 gezonde personen.

Opmerkingen

Stockley: no adverse interaction would be expected with concurrent use.

SPC Fromirex: frovatriptan is geen substraat voor MAO-A; het risico van een serotoninesyndroom of hypertensie is niet uitgesloten.

SPC Naramig: in vitro geen remming MAO, dus geen in vivo-studies uitgevoerd met MAO-remmers.

SPC Relpax: eletriptan is geen substraat voor MAO; een interactie met MAO-remmers is niet waarschijnlijk.

SPC Aurorix: moclobemide kan metabolisme remmen van geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd door MAO-A (zoals triptanen) hetgeen kan leiden tot verhoogde plasmaconcentraties.

Alfanum. code	--			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
Incidentie	

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	23 april 2002