

MAO-remmers/moclobemide + atomoxetine

Bron	Pagina	ref.nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten	-	-			
Stockley ed. 6	-	-			
Extra	-				

Opmerkingen:

Deel IB Strattera:

Contra-indicaties: atomoxetine mag niet worden gebruikt in combinatie met MAO-remmers. Interval 2 weken nodig. Geen verdere uitleg.

Amerikaanse productinformatie geeft als toelichting: met andere geneesmiddelen die monoamine concentraties in de hersenen verhogen zijn in combinatie met MAO-remmers ernstige reacties gezien (serotoninesyndroom). Fabrikant: er zijn geen specifieke onderzoeksgegevens bekend over combinatie met MAO-remmers.

Opmerking WINAp:

De monoamines serotonine, norepinefrine en epinefrine worden vooral door MAO-A afgebroken.

Atomoxetine verhoogt de concentratie norepinefrine en niet de concentratie serotonine. Theoretische zou je dus wel verhoging norepinefrine kunnen krijgen, maar lijkt serotoninesyndroom ons onlogisch.

Voorstel code	--			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
Incidentie	

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	22 maart 2005

Tekst						
Raadpleeg	Besluit van de Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) van WINAp Geneesmiddelinformatie op 22-3-2005: dit is GEEN interactie. Ondanks dat in het registratiedossier van atomoxetine de interactie wordt gemeld ("combinatie met een MAO-remmer is gecontraïndiceerd"), kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur. De contra-indicatie is gebaseerd op angst voor een serotoninesyndroom. Dit is theoretisch gezien niet logisch, daar atomoxetine selectief de heropname van norepinefrine remt en geen invloed heeft op serotonine of dopamine. Literatuur: - Deel IB Strattera.					
	Monitoring	Staken	Voorschrijver	Balie	Apotheker	Periode
	0	0	0	0	0	0

Opmerkingen: