

Eletriptan + CYP3A4-remmers

M 688

Bron	Pagina	Ref.nr.	Bewijs Effect (omschrijving + letter)		
Hansten					
Stockley ed. 6	886	1		prod.info	
Extra	SPC Relpax - erytromycine - ketoconazol - fluconazol - verapamil		0	erytromycine: toename Cmax 2x, AUC 3.6x, t1/2 van 4.6 naar 7.1 uur ketoconazol: toename Cmax 2.7x, AUC 5.9x, t1/2 van 4.8 naar 8.3 uur fluconazol: toename Cmax 1.4x, AUC 2x verapamil: toename Cmax 2.2x, AUC 2.7x	A

Opmerkingen

SPC Relpax: niet combineren met krachtige remmers CYP3A4, zoals ketoconazol, itraconazol, erytromycine, claritromycine.

Fabrikant (Pfizer) heeft gegevens (niet gepubliceerd) overlegd waarbij geen verschil in voorkomen van aantal bijwerkingen in de groep die eletriptan zonder krachtige CYP3A4 remmers gebruikten en in de groep die wel eletriptan met krachtige CYP3A4 remmers gebruikten.

Toename van eletriptanspiegels is wel gemeten, maar geen gevolgen.

PubMed/IDIS: geen nieuwe info.

Alfanum. code	0A			
Risicogroep	snelle metaboliseerders CYP2D6			
Incidentie				

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	11 december 2001