

Thyreomimetica + raloxifeen

5614

Bron	Pagina	Ref.nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten okt. 2003	955a	1		Zie opmerkingen	
Stockley ed. 6	-	-			
Extra					

Opmerkingen

Hansten pag. 955a ref. 1: vrouw (79) op levothyroxine: symptomen van hypo-thyreoidie, TSH-spiegel 14.5 µE/ml, 2-3 maanden na toevoegen raloxifeen 60 mg/dag. TSH-spiegel bleef hoog ondanks verhogen levothyroxine van 0.15 naar 0.3 mg/dag. Klachten verdwenen na innemen met interval van 12 uur. Een absorptietest toonde lagere T4-spiegels na gelijktijdige inname tov inname van alléén levothyroxine. De vrouw gebruikte ook oa ferrosulfaat en multivitaminen 4 uur NA levothyroxine, en maandelijks vit B12-injecties. Dit gaf geen problemen tot aan raloxifeengebruik.
NB. Dit artikel is ook gerefereerd in MFM 2004;42:10.

Het mechanisme is onbekend, raloxifeen is geen adsorbens.

SPC Evista: EVISTA geeft een geringe verhoging van hormoon-bindende globuline-concentraties, waaronder geslachtshormoon bindende globuline (SHBG), thyroxine-bindende globuline (TBG), en corticosteroidbindende globuline (CBG), met bijbehorende toenames van de totale hormoon concentraties. Deze veranderingen hebben geen invloed op de concentraties vrije hormonen.

Gezocht op tamoxifeen en toremifeen: resultaat 0.

Alfanum. code	--			
Risicogroep				
Incidentie				

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	7 februari 2006

Raadpleeg	Besluit van de Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) van WINAp Geneesmiddelinformatie op 28-06-2005: dit is GEEN interactie. De Arch Intern Med beschrijft een casus van hypothyreoidie 2-3 maanden na toevoegen raloxifeen aan levothyroxine. De klachten verdwenen bij innemen met een interval van 12 uur. Het mechanisme achter deze melding is onduidelijk; raloxifeen staat niet bekend als absorptieverlager. Literatuur: - Arch Intern Med 2003;163:1367-70. - Hansten					
	Monitoring	Staken	Voorschrijver	Balie	Apotheker	Periode
	0	0	0	0	0	-