

# Tolterodine + Duloxetine

M726

Bron	Pagina	Ref.nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten jan.2005	-			
Stockley ed. 6	-			
Extra	Hua TC. Br J Clin Pharmacol 2004:57:652-6.  Zie ook opmerkingen		3	16 vrijwilligers (allen extensive metabolizers), tolterodine 2 mg 2dd + duloxetine 40 mg 2dd: Cmax tolterodine 1.6x zo hoog en AUC 1.7x zo hoog, t1/2 en klaring onveranderd; bij combinatie zijn bijwerkingen gedurende de eerste 3 dagen vaker gemeld dan bij monotherapie tolterodine. Conclusie auteurs: '...there should not be a need for routine adjustment of tolterodine dosage in the presence of duloxetine.'

## Opmerkingen

SPC Cymbalta: duloxetine verhoogt AUC tolterodine met 71%, maar heeft geen invloed op de kinetiek van de 5-OH-metabooliet van tolterodine; er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen. Voorzichtigheid is geboden bij combinatie met middelen die voornamelijk via CYP2D6 worden gemetaboliseerd als deze een smalle therapeutische breedte hebben.

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	ja	nee	7 februari 2006