

# Tetracyclines/ijzer + sevelameer

5673

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
SPC Renagel	sevelameer	Renagel kan invloed hebben op de biologische beschikbaarheid van andere geneesmiddelen. Bij toediening van een geneesmiddel waarbij een vermindering van de biologische beschikbaarheid een klinisch significant effect zou kunnen hebben op de veiligheid of de werkzaamheid, moet het geneesmiddel minimaal één uur vóór of drie uur na Renagel worden toegediend of de arts moet overwegen de bloedniveaus te bewaken. Bij dierproeven veranderde de toediening van een enkelvoudige dosis Renagel samen met tetracycline, noch de piekserumconcentratie noch de AUC voor serumconcentraties van deze producten. EPAR: geen extra informatie.
Pruchnicki MC. J Clin Pharmacol 2002;42:1171-6.	ijzer + sevelameer	sevelameer had een niet-significante invloed op de relatieve AUC van Fe (van 1 naar 0.9), in tegenstelling tot CaCO <sub>3</sub> (0.81) en Ca-acetaat (0.73).

## Opmerkingen

WFG 24-11-2015: oraal ferrioxidesaccharaat (Velphoro) ontkoppelen. wordt toegepast bij hyperfosfatemie bij dialysepatiënten. Het betreft binding van fosfaat aan ijzer; de systemische absorptie van ijzer is hierbij niet relevant voor de fosfaatbindende werking.

IDIS/PubMed: levert niets op.

Alfanum. code	--		
---------------	----	--	--

Risicogroep	
-------------	--

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	7 februari 2006