

Tacrolimus + Sevelameer

M 736

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Merkle M. Transplantation 2005;80:707.	tacrolimus + sevelameer	niertransplantatiepatiënt (55 jaar) op lage dosis tacrolimus, corticosteroid en hemodialyse: progressieve afname tacrolimusspiegel na start sevelameer, en afname nierfunctie. Dosis tacrolimus moest verhoogd worden. Kinetiekstudie in de patiënt: - tijdens sevelameer: Cmax van 9.9 ng/ml, AUC 4.04 ng.h/ml - 3 dagen na staken sevelameer: Cmax 13.1 ng/ml, AUC 9.69 ng.h/ml	2B

Overig	Stof	Effect
SPC Renagel	tacrolimus + sevelameer	verlaagde spiegels mycofenolaatmofetil, ciclosporine en tacrolimus zijn gemeld bij combinatie met sevelameer zonder enige klinsiche gevolgen. Als dit van belang is voor de veiligheid of de werkzaamheid, moet het geneesmiddel minimaal één uur vóór of drie uur na Renagel worden toegediend of de arts moet overwegen de bloedniveaus te bewaken.

Opmerkingen

SPC Advagraft, Prograft: sevelameer niet genoemd.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	ja	ja	28 maart 2006