

Chinolonen/tetracyclines + strontiumranelaat

6122

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten	-				
Stockley ed. 7	1032			prod.info	
Extra	Deel IB Protelos		0	zie opmerkingen	-

Opmerkingen

Deel IB Protelos: daar divalente kationen een complex vormen met orale tetracycline- en chinolonantibiotica op gastro-intestinaal niveau en zodoende de absorptie remmen, is gelijktijdige toediening van strontiumranelaat met deze middelen niet aanbevolen. Daarom dient uit voorzorg de strontiumranelaatbehandeling tijdelijk te worden gestaakt tijdens behandeling met een oraal tetracycline of chinolon.

EPAR Protelos: divalente kationen zoals Ca en Sr kunnen complexen vormen met bv. orale tetracycline- en chinolonantibiotica en zo de absorptie verminderen.

Fabrikant: combinatie niet getest, maar uit voorzorg interval van 2 uur hanteren.

Geen literatuur te vinden in Hansten, Stockley, IDIS, Pubmed.

Alfanum. code	0-			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
Incidentie	

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	0-	nee	nee	19 december 2006

Raadpleeg	Besluit van de Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) van WINAp Geneesmiddelinformatie op 19-12-2006: dit is GEEN interactie. Ondanks dat in het registratiedossier van Protelos de interactie wordt genoemd kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur. Er zijn geen studies uitgevoerd. In theorie zou de absorptie van het chinolon of tetracycline kunnen dalen bij gelijktijdig innemen met strontiumranelaat. Literatuur: Stockley p. 1032. Registratiedossier (deel IB) Protelos					
	Monitoring	Staken	Voorschrijver	Balie	Apotheker	Periode
	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen