

Busulfan + Diverse stoffen

MFB 794

paracetamol/amfotericine B

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten	--			
Stockley ed. 7	--			
Extra				

Opmerkingen

Paracetamol:

SPC Busilvex: paracetamol kan de glutathionspiegel in bloed en weefsels verlagen, hierdoor kan een verminderde busulfanklaring optreden. Extra voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig of voorafgaand (< 72 uur) gebruik.

SPC Myleran: geen melding mogelijke interactie.

SPC paracetamol: geen melding mogelijke interactie.

Mechanisme: paracetamol kan de glutathionspiegel verlagen, hierdoor zou de busulfanklaring kunnen afnemen.

Amfotericine:

Baxter p. 24, verwijst naar SPC Abelcet: "gecombineerd gebruik van amfotericine en antineoplastische middelen (o.a. busulfan) kunnen het risico van nefrotoxiciteit, hypotensie en bronchospasme vergroten."

→ Opmerking GIC: SPC's Abelcet, Ambisome, Amphocil en Fungizone op CBG-site vermelden dat (conventioneel) amfotericine potentieel nefrotoxisch is, controle nodig bij gelijktijdig gebruik van nefrotoxische stoffen zoals cisplatine. Busulfan wordt niet genoemd.

SPC Busilvex/Myleran: geen melding mogelijke interactie.

Pubmed/IDIS/etc: geen aanvullende resultaten.

Alfanum. code	--			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncolA	Nee	Nee	25 april 2007