

Sorafenib + CYP3A4-remmers

M821

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
SPC Nexavar + Scientific discussion	ketoconazol	geen toename AUC, Cmax en t _{1/2} sorafenib bij 16 vrijwilligers na 400 mg ketoconazol 1x per dag gedurende 7 dagen en 1-malig 50 mg sorafenib; dit wijst erop dat een klinsich farmacokinetische interactie tussen sorafenib en CYP3A4-remmers onwaarschijnlijk is.

Opmerkingen

Werkgroep Interacties Oncologische middelen 10-4-19: posaconazol toevoegen aan lijst krachtige CYP3A4-remmers.

Tel. fabrikant (Bayer): Investigator's Brochure is vertrouwelijk, wordt niet gegeven. Verwezen wordt naar fase III-studie in NEJM 2007;356;125-34.

→ GIC: in deze studie is gekeken naar effect sorafenib; eindpunten: overall survival, progression-free survival. Geeft wel informatie over bijwerkingen, maar niets over interacties.

Pubmed/IDIS/etc: geen aanvullende informatie.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncoIA	Nee	Nee	10 april 2019