

Etoposide + Atovaquon

M826

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Poll van de ME. Cancer Chemother Pharmacol 2001;47:467-72.	etoposide + atovaquon	9 kinderen (ALL of non-hodgkin) profylactisch atovaquon 45 mg/kg/dag of cotrimoxazol 900 mg/m ² /dag, 1 week vóór chemokuur met etoposide 300 mg/m ² infuus: - toename AUC etoposide 1.09x, AUC etoposide catechol 1.3x bij gebruik atovaquon in vergelijking met cotrimoxazol. <u>In vitro</u> : atovaquon remt vorming etoposide-catechol. Auteurs: een matige toename. → Werkgroep: toename 1.09x is niet klinisch relevant, valt weg in ruis.	3A

Overig	Stof	Effect
SPC Vepesid, Etoposide, atovaquon	etoposide + atovaquon	geen melding mogelijke interactie.

Opmerkingen

Stockley: noemt alleen van de Poll, 'atovaquone may modestly increase exposure to the metabolite, etoposide catechol.'

Pubmed nov 2016: geen aanvullende resultaten.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncolA	Ja	Nee	3 oktober 2007