

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten okt.00	--			
Stockley ed. 8	--			
Extra	Knopp RH. Metabolism 2006;55:1697-703.		3	afname totaal ezetimib 21% ('niet significant) na 12 weken bij gescheiden inname. Vrijwilligers kregen 6 weken ezetimib 10 mg 1dd bedtijd + colesevelam 1875 mg 2dd óf placebo met eten. Studie naar therapeutisch effect combinatie en naar beïnvloeding ezetimibspiegel door colesevelam. → GIC: de afname van 21% bij gescheiden inname zou bij gelijktijdige inname dus heel goed meer kunnen zijn.

Opmerkingen

SPC Ezetrol: werking ezetimib kan afnemen. Neem ezetimib minstens 2 uur voor of 4 uur na de galzuurbindende hars in.

SPC Cholestagel (colesevelam) meldt de interactie niet.

Ezetimib wordt in de darmwand omgezet tot het actieve glucuronide. Ezetimib en zijn glucuronide-conjugaat ondergaan een enterohepatische kringloop.

Mechanisme: ezetimib wordt waarschijnlijk in de darm gebonden aan de hars. Hierdoor neemt zowel de absorptie af, en wordt de enterohepatische kringloop van ezetimib doorbroken.

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	ja	nee	29 januari 2008