

Doxorubicine + Barbituraten

M864

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten okt.2000	540	1		= Stockley p. 613 ref. 1
Stockley ed. 8	613	1 = Riggs CE. Clinical pharmacology & therapeutics 1982;31:262 <i>abstract uit 1982</i>	-	Met barbituraat was er iets hogere klaring doxorubicine (318 vs 202 ml/min) bij 8 resp. 97 patiënten. Niet gespecificeerd welk barbituraat, dosis etc. Er is ook gekeken naar prochloorperazine, dit had geen effect op doxorubicine. → Werkgroep Oncolytica-interacties: referentie is te vaag, telt niet mee.
	613	2		studie in muizen. Niet te bestellen.
Extra				

Opmerkingen

Doxorubicine

Hansten: no specific action is required.

SPC Myocet (doxorubicine liposomaal): geen specifieke studies gedaan, maar mogelijk interactie met fenobarbital of fenytoïne.

SPC Doxorubicine generiek: middelen die CYP induceren, zoals rifampicine en barbituraten kunnen metabolisme versnellen. Bovendien kan voorbehandeling met fenytoïne de functie van beenmerg beïnvloeden, met als mogelijk gevolg ernstige verstoringen bij bloedvorming.

SPC Caelyx: niet genoemd.

SPC's Diphantoïne-Z, Epanutin, Fenobarbital PCH, Rifadin, Mycobutin: --

Overige antracyclines

SPC Farmorubicine: middelen die CYP induceren, zoals rifampicine en barbituraten kunnen metabolisme versnellen.

SPC Cerubidine, DaunoXome, Mitoxantrone, Zavedos: niet genoemd.

IDIS/Pubmed/Baxter: -- gezocht op fenobarb, barbituraten, hypericum, rifampicine, rifabutine, inducers.

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncolA	nee	nee	7 mei 2008