

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

## Opmerkingen

Het betreft de stoffen uit de Informatiegroep 'Allergenen van natuurlijke oorsprong'. De 'Allergenen voor diagnostiek voor contactdermatitis' zitten niet in de G-standaard, de samenstelling wisselt te sterk.

SPC Grazax: gelijktijdige behandeling met symptomatische anti-allergische medicatie (bijv. antihistaminica, corticosteroiden en mestcel stabilisatoren) kan bij de patiënt de tolerantiegrens op de immunotherapie verhogen.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over mogelijke gevolgen van een gelijktijdige immunotherapie met andere allergenen tijdens de behandeling met Grazax.

Contraïndicaties: kwaadaardige of systemische aandoeningen die het immuunsysteem beïnvloeden (bijv. auto-immuunziekten, immuuncomplex reacties of immuundeficienties).

SPC Alutard SQ, Pollinex: niet starten bij gebruik immunosuppressiva, immunosuppressiva zijn gecontraïndiceerd.

SPC Pharmedalgen: antihistaminica en bronchospasmolytica kunnen de tolerantiegrens veranderen; na beëindiging van deze middelen kan dosisreductie van de allergeendosis nodig zijn. Ook corticosteroiden en mestcelstabilisatoren kunnen invloed hebben.

Contraïndicaties: immunosuppressiva, aandoeningen die het immuunsysteem beïnvloeden (bijv. auto-immuunziekten, maligniteit of immuundeficienties).

Priktest: deze zitten niet in de G-standaard, de samenstelling wisselt te sterk.

SPC Soluprick: 30 mg predniso(lo)n per dag niet langer dan een week of een onderhoudsdosis van 10 mg of minder predniso(lo)n per dag heeft geen invloed op de huidtest. Sterk werkend cortico-zalf onderdrukt reactie huidtest.

SPC True Test, Trolab: contact-allergisch onderzoek niet uitvoeren bij gebruik van orale corticosteroiden met een dosering hoger dan oraal prednison 5 mg/dag of bij lokale corticosteroiden op het testoppervlak; deze moeten 2 weken vóór de test worden onderbroken.

SPC Bencard Priktest Voedingsmiddelen: symptomatische anti-allergica zoals antihistaminica, corticosteroiden en mestcelstabilisatoren of middelen met een dergelijke werking als nevenwerking kan het tolerantieniveau van de patiënt voor allergenen prikkels doen toenemen en daardoor een vals negatief testresultaat veroorzaken. Dergelijk middelen minimaal 48 uur voor aanvang van de priktest staken. Inhalatiecorticosteroiden hebben geen invloed op de testuitslag.

PubMed –

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	nee	nee	13 mei 2008