

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten okt 2006	988	6 - duloxetine, venlafaxine		FDA: combinatie triptan + SNRI kan leiden tot serotoninesyndroom. Hierop is meer kans bij starten of ophogen van triptan of SNRI. Advies: weeg risico af tegen voordeel therapie; informeer patiënt over mogelijkheid ontwikkelen serotoninesyndroom; observeer patiënt regelmatig, m.n. bij wijzigingen in therapie; instrueer patiënt over contact opnemen met arts indien symptomen serotoninesyndroom optreden. <a href="http://www.fda.gov/cder/drug/advisory/SSRI_SS200607.htm">http://www.fda.gov/cder/drug/advisory/SSRI_SS200607.htm</a> . Geraadpleegd 03-07-2008.
Stockley ed. 8	605-6	duloxetine, venlafaxine		venlafaxine and duloxetine are predicted to interact similarly as SSRIs.
Extra				

### Opmerkingen

Hansten: wees alert op aanwijzingen serotoninesyndroom.

Medscape General Medicine 2007;9:48: analyse van 29 casus waarop advies FDA is gebaseerd. Hiervan 6 met venlafaxine, geen met duloxetine. Van de 6 casus voldeed 1 aan Sternbach criteria, maar informatie zeer onvolledig. Geen casus voldeed aan Hunter criteria. <http://www.medscape.com/viewarticle/561741>. Geraadpleegd 03-07-2008.

SPC Eflexor: -

SPC Yentreve (duloxetine): gebruik in combinatie met triptanen wordt niet aangeraden.

Pubmed, IDIS: geen informatie.

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Nee	Nee	9 september 2008