

Acenocoumarol/fenprocoumon +
megestrol/medroxyprogesteron

MFB 951

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten	--			
Stockley ed. 8	--			
Extra				

Opmerkingen

Stockley: evidence is limited, maar wat bekend is suggereert dat monitoring nodig kan zijn bij high-dose megestrol of Me-progesteron.

SPC Megestrolacetaat PCH, Provera 100 mg, Marcoumar, Acenocoumarol: --

PubMed: niets aanvullends

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncoIA	ja	nee	13 mei 2009

Ter informatie: Warfarine + megestrol/medroxyprogesteron

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten	--				
Stockley ed. 8	424	1 - megestrol, medroxyprogesteron	1-2	toename t1/2 warfarine van 43.4 naar 74.4 h (71.4%) en afname klaring van 2.3 naar 1.5 ml/h*kg (34.8%) bij 4 patiënten met borstkanker. Regime: medroxyprogesteronacetaat 500 mg 2dd (n=2) of megestrolacetaat 160 mg 1dd (n=2), plus warfarine 0.3 mg/kg 1-malig.	(A)
	424	2 - megestrol		zie opmerkingen	
Extra					

Opmerkingen

Stockley: evidence is limited, maar wat bekend is suggereert dat monitoring nodig kan zijn bij high-dose megestrol of Me-progesteron.

- ref. 2: korte melding toename bloedingstijd bij patient die een anticoagulans (welke is onbekend) gebruikt en megestrol (dosis niet gegeven). → GIC: niet in bezit, niet te bestellen (tijdschrift niet te vinden in PubMed).