

Acenocoumarol/fenprocoumon + Anti-androgenen

MFB 952

Protrombinetijd = PT

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
SPC Flutamide Mylan (oud)	flutamide	toename INR icm warfarine GIC: flutamide is udh, registratie 31-12-2018 doorgehaald.
SPC Casodex	bicalutamide	in vitro onderzoek heeft aangetoond dat bicalutamide warfarine van de eiwitbindingsplaats kan verdringen. Om deze reden wordt aangeraden bij aanvang van therapie met Casodex bij patiënten die een VKA gebruiken, de PT te controleren.
SPC Anandron	nilutamide	aangezien nilutamide het effect van anticoagulantia kan versterken is het aan te bevelen de bloedstolling nauwkeurig te controleren zo nodig de dosering van deze stoffen te verlagen.
SPC Zytiga, Nubeqa	abirateron, darolutamide	Warfarine/VKA niet genoemd

Opmerkingen

Stockley: no interaction established (might have been expected to come to light by now).

PubMed aug 2020: geen extra informatie

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncoIA	Nee	Nee	30 september 2020

Ter informatie: Warfarine + Anti-androgenen

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Konishi Y. Intern Med 2019;58:3251-3. doi: 10.2169/internalmedicine.29 73-19.	warfarine + flutamide	casus: toename INR 2.3 →17.1, bloeding (tandvlees, oor, subcutaan, hematurie), ong. 3 weken na start flutamide (ipv bicalutamide) vanwege progressie prostaatcancer bij man (86) op warfarine, met pacemaker voor atriumfibrilleren met bradycardie; protrombinecomplex en fytomenadion toegediend; effect op INR hield aan tot ong 2 weken na staken flutamide.	(1D?)

Overig	Stof	Effect
Tay MH. Ann Oncol 2004;15:974-8.	warfarine + bicalutamide	studie naar effect additie finasteride aan high-dose bicalutamide bij gevorderd adenocarcinoom van de prostaat met 41 patiënten. Bij de geobserveerde toxiciteit wordt kort aangestipt dat 1 patiënt verlengde PT kreeg bij gebruik bicalutamide en warfarine. → GIC: referentie niet onderbouwend.
Schering-Plough Ltd. Personal communication, March 1990.	warfarine + flutamide	pers. mededeling fabrikant uit 1990: 5 cases van toename PT, dosisreductie warfarine nodig van 35 naar 22.5 mg/week over 2 maanden. Verder niet gepubliceerd.