

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten	--			
Stockley ed. 8	--			
Extra				
Stockley ed. 8	641	1 - cimetidine <i>abstract 1996</i>		geen significant effect op kinetiek letrozol 2.5 mg 1x bij combinatie met cimetidine 400 mg 2dd bij 17 vrijwilligers. Met cimetidine vs zonder cimetidine: Cmax letrozol 104 vs 96.7 nmol/l AUC letrozol 5671 vs 6067 nmolxh/l t1/2 letrozol 73 vs 66 uur
	641	1 = prod.info UK - diverse stoffen		geen interactie met bdz, barbituraten, diclofenac, furosemide, ibuprofen, omeprazol, paracetamol
Extra	SPC Femara - cimetidine			uit klinische studies naar interacties met cimetidine is gebleken dat gelijktijdig gebruik van Femara niet tot klinisch significante interacties leidt.

Opmerkingen

SPC Femara: evaluatie van de klinische studie database leverde geen bewijs van andere klinisch relevante interacties met andere veel voorgeschreven geneesmiddelen.

Tot nu toe is er geen klinische ervaring met het gebruik van Femara in combinatie met andere oncolytica.

In vitro remt letrozol CYP2A6 en, in geringere mate, CYP2C19. Daarom is voorzichtigheid geboden bij gelijktijdige toediening met geneesmiddelen waarvan de dispositie voornamelijk afhankelijk is van deze isoenzymen en waarvan de therapeutische index klein is.

PubMed: niks extra.

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncolA	Nee	Nee	14 oktober 2009