

| Bron | Pagina | Ref. nr. | Bewijs | Effect (omschrijving + letter) |
|----------------|---------------------------|--|--------|--|
| Hansten | -- | | | |
| Stockley ed. 8 | -- | | | |
| Extra | | | | |
| Stockley ed. 8 | 611 | 1 – quinapril = Repetto L. Ann Oncol 2003;14:1587-8. | | geen significant effect op plasmaspiegel anastrozol bij combinatie met quinapril bij 5 oudere vrouwen (gem. 77) met borstkanker. Zonder quinapril (dag 28) vs met quinapril (dag 56): spiegel anastrozol 49.16 vs 49.80 ng/ml. Regime: anastrozol 1 mg/dag gedurende ten minste 10 weken, na 4 weken start quinapril gedurende 28 dagen. |
| | 611 | 4 = prod.info UK | | prod.info UK: geen interactie met 'veel gebruikte geneesmiddelen'. |
| Extra | SPC Arimidex - cimetidine | | | uit klinische studies naar interacties met cimetidine is gebleken dat gelijktijdig gebruik met Arimidex niet tot klinisch significante interacties leidt. |

Opmerkingen

Stockley: waarschijnlijk geen interactie met middelen als acetylsalicylzuur, cimetidine, digoxine, orale antidiabetica of quinapril. Heeft waarschijnlijk geen effect op CYP-enzymen.

PubMed: niks extra.

| | |
|-------------|--|
| Risicogroep | |
| Incidentie | |

| | Interactie | Actie | Datum |
|----------------------|------------|-------|-----------------|
| Beslissing WG OncolA | Nee | Nee | 14 oktober 2009 |