

Daunorubicine + Indinavir/Ritonavir

M971

haart = highly active antiretroviral therapy pi = proteaseremmer
NRTI = nucleoside reverse transcriptase inhibitors

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten	--			
Stockley ed. 8	--			
Extra	Fumagalli L. Cancer Chemother Pharmacol 2000;45:495-501. - daunorubicine + cART* * indinavir (9) of ritonavir (6) plus 2 NRTI's			geen significant verschil in kinetiek liposomaal daunorubicine met of zonder haart bij 18 patiënten + idv + rtv zonder haart Cmax dauno: 15.1 14.5 16.4 AUC dauno : 107 101 115 Cl dauno : 0.50 0.46 0.39 t1/2 dauno : 5.8 6.5 5.6 In alle groepen was de daunorubicinospiegel 25-30x lager dan daunorubicine. De data zijn incompleet voor 2 patiënten op saquinavir.

Opmerkingen

- HIV/AIDS Nieuwsbulletin 2008;nr.2:28-30: geen effect op daunorubicine liposomaal door pi's, gebaseerd op Fumagalli 2000.
- Aidstabel versie 15-06-09: daunorubicine met alle pi's, score 0E, geen ref. opgegeven.

SPC DaunoXome: proteaseremmers en NNRTI's remmen CYP3A en P-gp; daunorubicine is substraat hiervoor. Daarom bestaat de theoretische mogelijkheid van interactie. Echter tot dusver heeft een enkele studie aangetoond dat er geen effect bestaat van proteaseremmers of NNRTI's op de kinetiek van daunorubicine. SPC Cerubidine: niet genoemd.

PubMed: niets.

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	nee	nee	14 oktober 2009