

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten	-				
Stockley ed. 8	-				
Extra					
Stockley ed. 8	701-2	3 – cimetidine		effect clopidogrel niet beïnvloed door cimetidine Engelse productinformatie	

Opmerkingen

SPC Plavix (rev 21, 13-10-2009): clopidogrel wordt gedeeltelijk door CYP2C19 gemetaboliseerd tot de actieve metaboliet. Combinatie met remmers van CYP2C19 wordt afgeraden, omdat het gebruik hiervan naar verwachting kan leiden tot een verlaagde plasmaspiegel van de actieve metaboliet van clopidogrel. CYP2C19-remmers (niet zijnde protonpompremmers) volgens het SPC: fluvoxamine, fluoxetine, moclobemide, voriconazol, fluconazol, ticlopidine, ciprofloxacin, cimetidine, carbamazepine, oxcabazepine, chlooramfenicol.

→ WINAp: vreemd dat in dit rijtje is opgenomen:

- cimetidine: het SPC vermeldt namelijk dat er geen bewijs is dat H₂-antihistaminica de werking van clopidogrel verstoren
volgens Stockley ref. 3 (productinformatie Plavix UK) wordt het effect van clopidogrel niet beïnvloed door cimetidine.
- ticlopidine: is al jaren uit de handel. In 1999 is de handelsvergunning niet verlengd, omdat een veiliger alternatief (clopidogrel.....) verkrijgbaar is
- chlooramfenicol: wordt alleen oculair en auriculair toegepast
- ciprofloxacin, carbamazepine: staan niet als CYP2C19-remmer genoemd in de Hansten top 100.

Wat overblijft uit dat SPC-rijtje (fluvoxamine, fluoxetine, moclobemide, voriconazol, fluconazol, oxcabazepine) levert 0 hits op bij een search in PubMed/Idis.

Alfanum. code	--			
Risicogroep				
Incidentie				

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	27 oktober 2009