

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten	--				
Stockley ed. 8	743	1 = Moss JH. Can J Psychiatry 1986;31:865-6.	1	onbeweeglijkheid, stijfheid en sprakeloosheid (ernstig parkinsonisme) na toevoegen chloorpromazine 2x 25 mg i.v. aan tetrabenazine 100 mg/dag bij vrouw (63) met ziekte van Huntington. Verschijnselen verdwenen snel na staken beide middelen. Na 48 uur herstart tetrabenazine zonder problemen. Chloorpromazine in verleden toegepast zonder tetrabenazine, werd toen goed getolereerd.	C
Extra					

Opmerkingen

WFG: actie Ja, ook al is er slechts 1 casus, maar hierin is duidelijk effect te zien. Er is een goede farmacologische onderbouwing. Bij zeldzame ziekte is er o.h.a. weinig bewijs beschikbaar en is 1 casus voldoende. Kies een atypisch antipsychoticum.

Stockley: the reason for this reaction is not understood, and, as tetrabenazine is used to treat movement disorders its clinical significance is unclear.

SPC Xenazine: de kans van een significante dopaminedepletie bestaat wanneer tetrabenazine gelijktijdig met neuroleptica wordt toegediend, en patiënten moeten klinisch worden gecontroleerd op de ontwikkeling van parkinsonisme. In geïsoleerde gevallen is maligne neurolepticasyndroom waargenomen.

Fabrikant per e-mail gevraagd om studieresultaten, geen reactie.

Andere antipsychotica

Clin Neuropharmacol 1992;15:63-8: maligne neurolepticasyndroom (ernstige rigiditeit, verminderd bewustzijn, zweten, pols 89 slagen/minuut, temp 41°C, bloeddruk tussen 90/50 en 140/80 mmHg, serumcreatininekinase 2850 IU/l) bij vrouw (53) met ziekte van Huntington. Symptomen traden op 3 weken na start tetrabenazine 100 mg/dag en abrupt staken haloperidol 2 mg/dag oraal. Na staken tetrabenazine verdwenen verschijnselen geleidelijk. Tetrabenazine opnieuw gestart, langzaam opgebouwd tot 765 mg/dag, geen problemen.

→ GIC: lijkt bijwerking tetrabenazine te zijn en geen interactie: haloperidol was al 3 weken gestaakt op moment dat verschijnselen optraden.

J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2007;19:484-5: ontwikkeling tardieve dystonie 6 jaar na start olanzapine 5 mg/dag, symptomen verdwenen na staken olanzapine en start tetrabenazine (25 mg/dag, opgebouwd naar 75 mg/dag). Daarna patiënt overgezet op combinatie tetrabenazine + quetiapine, geen onvrijwillige bewegingen meer.

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	27 oktober 2009