

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten	--			
Stockley ed. 8	--			
Extra				
Extra	Clin Ther 2008;30:1283-9 - rifampicine zie opmerkingen			geen significant verschil $AUC_{0-\infty}$, C_{max} en $t_{1/2}$ rosuvastatine tussen rosuvastatine + rifampicine en rosuvastatine + placebo. Grote interindividuele variatie! Regime: rifampicine 450 mg 1 dd of placebo op dag 1 t/m 6, rosuvastatine 20 mg 1 dd op dag 0 + 7. Studie onder 18 gezonde Chinezen.

Opmerkingen

Extra: → WFG: studieopzet te weinig gevoelig; rifampicine maar 6 dagen gegeven (CYP2C9 en CYP2C19 minder gevoelig voor inductie door rifampicine dan CYP3A4), rosuvastatine slechts 1 single dose. Gaat om Chinezen; ivm enzymverschillen tussen rassen is deze studie niet representatief voor de populatie in Nederland.

SPC Crestor: rosuvastatine is geen inductor van cytochroom P450-enzymen en is bovendien een slecht substraat voor deze iso-enzymen. Daarom worden geneesmiddelinteracties t.g.v. cytochroom P450 niet verwacht.

Alfanum. code	--			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
Incidentie	

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	8 december 2009